

1. OBJECTIF /DOMAINE D'APPLICATION

Description des mesures à prendre par les services d'Obstétrique et de Néonatalogie en cas d'hospitalisation d'une mère et/ou d'un nouveau-né dans le cadre de la prévention du risque ou d'une infection à COVID-19

A ce jour, les rares études disponibles indiquent qu'il n'y a pas de passage du coronavirus dans le lait de mère. L'allaitement direct ou l'alimentation par lait de mère en cas de séparation mère-bébé ne sont donc pas contraindiqués chez une mère suspecte ou confirmée d'infection à COVID-19. La Société Française de Néonatalogie et la SF de Pédiatrie proposent de respecter la volonté d'allaitement des mères. L'allaitement maternel, au vu des propriétés biologiques anti-infectieuses du lait de mère, est même recommandé pour les femmes qui désirent allaiter (AJOG 2020 Feb 24).

Ce guide s'adresse donc aux **deux situations suivantes** :

- **Allaitement direct** par une mère asymptomatique ou pauci symptomatique, porteuse du COVID-19 de son nouveau-né confiné avec elle en maternité, ou après arrivée au domicile.
- **Recueil du lait de mère** porteuse du COVID-19:
 - o hospitalisée du fait de sa propre pathologie en réanimation adulte médicale ou chirurgicale, soins intensifs ou tout autre service ne pouvant accueillir le nouveau-né malade (prématurité, pathologie congénitale ou toute autre pathologie)
 - o confinée en maternité et asymptomatique ou pauci symptomatique, et ayant été séparée de son enfant.
 - o dans ce cas l'alimentation de l'enfant se fait au biberon.

Les professionnels concernés sont les médecins séniors, les cadres et le personnel soignant des services d'Obstétrique et de Néonatalogie.

De nombreux autres professionnels sont informés de la procédure : Equipe Opérationnelle d'Hygiène, Virologie, PTM, Sécurité, SAMU, NRBC, Direction Générale

2. DESCRIPTION

A- ALLAITEMENT DIRECT

- Il est essentiel de **respecter en continue des règles d'hygiène strictes** :
 - o port du masque chirurgical en permanence (à changer toutes les 3 heures ou dès qu'il est souillé ou mouillé),
 - o lavage des mains très régulièrement à l'eau savonneuse
 - o frictionnement des mains avec une solution hydro-alcoolique à chaque fois avant de vous occuper de votre bébé.
 - o Bien attendre que les mains soient sèches avant de prendre le bébé.
 - o Ne pas toucher le masque ou le visage pendant l'allaitement
- Informer les mères de la nécessité d'un lavage des seins au savon doux non odorant et à l'eau régulièrement et au moins une fois par jour, et de ne pas toucher le masque ou le visage pendant l'allaitement.

Rédaction par : F. GEHANT, G. FOURIE, L. GRUSS, C. BRAUN, N. KNEZOVIC, V. SITTLER, P. KUHN

Approbation par : Pr KUHN Pierre, GEHANT Florence

B- RECUEIL DE LAIT

- Le tire-lait de la maman atteinte de Covid-19 lui est dédié spécifiquement,
- Le protocole des HUS de désinfection du tire-lait s'applique (cf doc institutionnel [Plaquelette_mamans_entretien_tire-lait_26-05-13.pdf](#)).
- Il est entretenu en respectant une désinfection de bas niveau, et devra être autoclavé avant d'être réutilisé par une autre maman.
- Après son entretien de bas niveau, il est emballé dans un sachet propre et reste dans la chambre.
- Avant de l'utiliser, la maman porteuse du Covid-19 garde son masque chirurgical, se désinfecte les mains avec une SHA et réalise une hygiène des seins à l'eau et au savon.
- La maman veille à ne pas toucher l'intérieur du biberon de recueil du lait tout au long de la traite.
- Après recueil du lait, une désinfection complète de l'extérieur du biberon, bien fermé, avec de l'alcool à 70° est réalisée avec le professionnel de santé (sage-femme, puéricultrice) qui recueille le biberon avant de l'acheminer vers le nouveau-né.
- Un transvasement sera réalisé secondairement si besoin du fait de l'altération possible du marquage de la graduation par l'alcool.

3. DOCUMENTS COMPLEMENTAIRES

- Procédure du 26/02/2020 de la sécurité / sûreté concernant les circuits des cas suspects ou confirmé COVID-19 en pédiatrie
- Recommandations de l'EOH, réactualisées

Modifications depuis la version précédente :		
xxx		
Rédigé par	Mmes F. Gehant, G. Fourie, L. Gruss, C. B. Houot, Frison, C. Braun Claudia, N.Knezovic, V. Sittler, C. Hernandez, P. Kuhn	le 13/03/2020
Validé par	Prs Kuhn P, Deruelle P, Hansman Y, Fafi-Kremer S, Laugel V, Drs Lavigne T, Astruc D, Matis J	le xx/xx/20xx
Homologation qualité		le xx/xx/20xx